

Л., д.р. 29.11.2015

- Новорожденная девочка поступила на 5 с.ж. после рождения.
- Диагноз направившего род.дома:
Постгипоксическое состояние.
Неонатальная аспирация мекония в анамнезе. Риск реализации ВУИ?
Переношенность 42 недели.
- Апгар 5/8 баллов

- При поступлении состояние средней тяжести. На осмотр реагирует активно, глазки открывает, зрачки $D=S$, фотореакция сохранена. Рефлексы симметричные, живые. Поза полуфлексии. Судорог нет.
- O_2 независима! Дыхание жесткое, проводится по всем легочным полям, хрипов нет. Механика-удовлетворительная.
- Тоны сердца ясные, ритмичные, шумов нет. Симптом «белого пятна» менее 3 сек.
- Диагноз при поступлении:
Неонатальная аспирация мекония.
Внутриутробная гипоксия, впервые отмеченная до начала родов.

- Лабораторно: В клиническом анализе крови: лейкоцитоза, анемии нет. В биохимич. анализе-без особенностей, СРБ – 1.
- Тактика:
- продолжение а/б терапии (ампициллин)
- расширение ЭП (начато на 1 с.ж.). (на 6 с.ж.:150 мл/кг/сут, 2,6 г/кг белка/сутки, 110 ккал/кг/сут)